

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**BUTELKA Z POLIETYLENU****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Theophyllum Tramco, 1,2 mg/ml, roztwór do infuzji

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml roztworu zawiera 1,2 mg teofiliny

250 ml roztworu zawiera:

Teofilina 300 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Glukoza 13,5 g

Woda do wstrzykiwań do 250 ml

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór do infuzji

250 ml Kod EAN: 5909990345915

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie dożylnie.

Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie należy stosować, jeżeli roztwór nie jest przezroczysty lub pojemnik jest uszkodzony.

Dodatkowy lek należy wprowadzać przez wkłucie w tym samym miejscu butelki, w którym później zostanie podłączony przyrząd do przetaczania.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Chronić od światła.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Tramco Sp. z o.o.
Wolskie, ul. Wolska 14
05-860 Płochocin

((LOGO Tramco))

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3459

13. NUMER SERII

Nr serii wytłoczony na butelce.

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lz - Lek stosowany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Opakowanie do jednorazowego użycia.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Nie dotyczy.